



Le comportement des fumeurs face à l'arrêt du tabac

Sondage Ifop pour Pfizer



N° 114623

Contacts Ifop :

Fabienne Gomant / Mathilde Moizo

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

Avril 2017

1 | La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Pfizer

Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
 L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1103 fumeurs, extrait d'un échantillon de 3600 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.	 La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.	 Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 10 avril 2017.

NB : Ce rapport présente les résultats sur la base des 1103 fumeurs ayant été éligibles à l'enquête

Note de lecture :



Désignent des écarts significativement supérieur/inférieur par rapport aux autres catégories

2 | Les résultats de l'étude

L'expérience de l'arrêt tabagique et le moyen utilisé

QUESTION : Avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer ?

QUESTION : La dernière fois que vous avez tenté d'arrêter de fumer, de quelle façon avez-vous procédé ?

Base : Aux fumeurs ayant déjà essayé d'arrêter de fumer, soit 69% de l'échantillon

TOTAL Oui
69%



Vous avez utilisé des substituts
nicotiniques vendus en pharmacies
(gommes à mâcher, pastilles, patchs...)

24%

Vous avez eu recours à d'autres méthodes
(hypnose, magnétisme, sophrologie...)


13%

Vous avez été suivi(e) par un professionnel
de santé ou un professionnel paramédical
(psychologue, pharmacien...)

11%


Vous avez arrêté seul(e) sans aucun
accompagnement

52%




QUESTION : A quel type de professionnel de santé ou paramédical vous êtes-vous adressé(e) pendant votre arrêt tabagique ?

 *Base : Aux fumeurs ayant déjà essayé d'arrêter de fumer à l'aide d'un professionnel de santé, soit 8% de l'échantillon*



QUESTION : Avez-vous suivi un traitement médicamenteux pendant la durée de votre arrêt tabagique ?


 *Base : Aux fumeurs ayant eu recours à un tabacologue ou à un médecin généraliste, soit 5% de l'échantillon*



Compte tenu de la faiblesse des répondants à cette question, les résultats sont à interpréter avec prudence

QUESTION : Pour quelle raison principale vous êtes-vous remis(e) à fumer ?

Base : Aux fumeurs ayant déjà essayé d'arrêter de fumer, soit 69% de l'échantillon



QUESTION : Seriez-vous disposé(e) à recourir (ou à recourir de nouveau) à un traitement médical pour arrêter de fumer définitivement ?

TOTAL Oui
51%

Oui, à un traitement
médical avec
accompagnement d'un
professionnel de santé
24%

Oui, à un traitement
médical à suivre seul(e)
27%

Non
49%

Total « OUI »
Ensemble : 51%

Age

18 à 24 ans **43%**

25 à 34 ans **51%**

35 à 49 ans **52%**

50 à 64 ans **51%**

65 ans et plus **57%**



A déjà essayé d'arrêter de fumer



Oui, plusieurs fois **66%**

Oui, une fois **53%**

Non **29%**

Fréquence tabagique




Fume Fréquemment **54%**

Fume occasionnellement **42%**


QUESTION : Pour quelle raison principale ne seriez-vous pas prêt(e) à recourir à un traitement médical ?

Base Aux fumeurs ne souhaitant pas recourir à un traitement médical, soit 49% de l'échantillon



QUESTION : Et dans l’hypothèse où il serait possible d’être remboursé du traitement médical, est ce que cela vous motiverait pour... ?

Base Aux fumeurs ne souhaitant pas recourir à un traitement médical, soit 49% de l’échantillon



QUESTION : Et dans l'hypothèse où il serait possible d'être remboursé du traitement médical, est ce que cela vous motiverait pour... ?

Base Aux fumeurs ne souhaitant pas recourir à un traitement médical, soit 49% de l'échantillon

- Consulter votre médecin, et vous faire accompagner médicalement -

