

Asthmatiques et COVID-19, un confinement à risque ?

Enquête réalisée pour



26 mai 2020


Contacts ifop :

Pôle « Actualités »

François KRAUS / Paul Cébille

TEL : 01 72 34 94 64 / 06 61 00 37 76

francois.kraus@ifop.com



Etude réalisée par l'Ifop pour SANOFI GENZYME

Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
		
L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 3 045 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.	La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas au regard : - De critères sociodémographiques : sexe, âge de l'individu ; - De critères socioprofessionnels : profession de l'individu - De critères géographiques : région et taille de l'unité urbaine de la commune résidence <i>Ces quotas ont été définis à partir des données de l'INSEE pour la population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (Enquête Emploi 2014).</i>	Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020.



IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la [loi du 25 avril 2016](#) qui impose de citer le nom de l'institut de sondage, le nom et la qualité du commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L'Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d'une **amende de 75 000 €**.

POUR CITER CETTE ETUDE, IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Sanofi Genzyme réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020 auprès d'un échantillon de 3 045 personnes, de la population française âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. »

A | LES CRAINTES SUSCITÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS



Question : Etes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations suivantes sur l'asthme?

Base : Aux asthmatiques actuels



Proportion d'asthmatiques "d'accord" avec les affirmations suivantes (en %)

Vrai

En tant qu'asthmatique, il est important de bien poursuivre mon traitement pendant l'épidémie liée au Coronavirus



Vrai

En cas de contamination par le Coronavirus, en tant qu'asthmatique je suis davantage exposé à des risques de complications respiratoires graves que le reste de la population




FAUX

En tant qu'asthmatique, vous pensez avoir plus de risque d'être contaminé par le Coronavirus que le reste de la population



Asthmatiques «sévères»
Autres asthmatiques





Zoom sur le profil des asthmatiques estimant que les asthmatiques ont plus de risque d'être contaminés par le Coronavirus que le reste de la population

Note de lecture : 67% des asthmatiques sévères sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des asthmatiques se situe à **60%**




Sexe




Age




Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle



Niveau de vie



Taille de l'agglomération



Indice de masse corporelle




Diagnostic comme asthmatique sévère




Type de signes cliniques




Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)




Recours aux services de santé pour l'asthme (1 an)



L'impact du virus sur son suivi médical



Impact de l'asthme sur la vie



Question : En raison de la mise en place du confinement et des risques d'exposition au Coronavirus, vous est-il arrivé... ?

Base : Aux asthmatiques actuels



Proportion d'asthmatiques à qui il est déjà arrivé ... (en %)

Craintes relatives au virus

De craindre de perdre la vie en étant personnellement touché par ce virus

**Comparatif national*



De craindre que vos problèmes respiratoires (ex : toux) soient des symptômes du Coronavirus



Craintes liées à son rapport aux autres

De craindre d'infecter les membres de votre entourage sans le savoir

**Comparatif national*



De ne pas oser sortir ou entrer en contacts avec les autres de peur d'être infecté par le virus



De susciter de l'inquiétude chez les autres lorsque vous toussiez ou avez une crise d'asthme



Craintes relatives au suivi de son asthme


De craindre d'être contaminé par le Coronavirus en vous rendant dans un hôpital ou un cabinet médical pour vos problèmes d'asthme ou en allant à la pharmacie pour chercher votre traitement



De craindre de ne pas être soigné (par exemple en cas de crise d'asthme) par les professionnels ou services de santé en raison du Coronavirus



■ Asthmatiques «sévères»
 ■ Autres asthmatiques





Zoom sur le profil des asthmatiques à qui il est arrivé de « craindre de perdre la vie en étant personnellement touché par ce virus »

Note de lecture : 72% des asthmatiques sévères sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des asthmatiques se situe à **64%**




Sexe




Age




Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle



Niveau de vie



Taille de l'agglomération



Indice de masse corporelle




Diagnostic comme asthmatique sévère





Type de signes cliniques




Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)




Recours aux services de santé pour l'asthme (1 an)



L'impact du virus sur son suivi médical



Impact de l'asthme sur la vie





Zoom sur le profil des asthmatiques à qui il est arrivé de « ne pas oser sortir ou entrer en contacts avec les autres de peur d'être infecté par le virus »

Note de lecture : 74% des asthmatiques sévères sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des asthmatiques se situe à **64%**




Sexe




Age




Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle



Niveau de vie



Taille de l'agglomération



Indice de masse corporelle




Diagnostic comme asthmatique sévère





Type de signes cliniques




Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)




Recours aux services de santé pour l'asthme (1 an)



L'impact du virus sur son suivi médical



Impact de l'asthme sur la vie





Zoom sur le profil des asthmatiques à qui il est arrivé de « craindre de ne pas être soigné par les professionnels de santé en raison du Coronavirus »

Note de lecture : 71% des asthmatiques ayant été hospitalisés dans l'année sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des asthmatiques se situe à **46%**




Sexe



Age




Niveau de diplôme




Catégorie socioprofessionnelle



Niveau de vie



Taille de l'agglomération



Indice de masse corporelle




Diagnostic comme asthmatique sévère





Type de signes cliniques




Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)




Recours aux services de santé pour l'asthme (1 an)



L'impact du virus sur son suivi médical



Impact de l'asthme sur la vie



B | L'IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LE SUIVI MÉDICAL DE SON ASTHME



Question : En raison de la mise en place du confinement et des risques d'exposition au Coronavirus, vous est-il arrivé... ?

Base : Aux asthmatiques actuels qui avaient un RDV/achats prévus

Proportion d'asthmatiques à qui il est arrivé... (en %)



D'annuler ou de reporter un rendez-vous avec un professionnel de santé en cabinet ou à l'hôpital qui devait vous permettre de suivre ou soigner vos problèmes d'asthme

27



De rechercher des informations sur l'impact du virus sur le traitement et le contrôle de l'asthme auprès de professionnels de santé




22



De transformer en téléconsultation (c'est-à-dire par téléphone ou via Internet) un rendez-vous avec un professionnel de santé en cabinet ou à l'hôpital qui devait vous permettre de suivre ou soigner vos problèmes d'asthme

22

Asthmatiques «sévères»
 Autres asthmatiques





Zoom sur le profil des asthmatiques à qui il est arrivé de « d'annuler ou de reporter un rendez-vous avec un professionnel de santé »



Note de lecture : 41% des asthmatiques sans traitement sont dans cette situation


Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des asthmatiques se situe à **27%**




Sexe




Age




Niveau de diplôme




Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de vie




Taille de l'agglomération




Indice de masse corporelle




Diagnostic comme asthmatique sévère





Type de signes cliniques




Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)




Recours aux services de santé pour l'asthme (1 an)



L'impact du virus sur son suivi médical



Impact de l'asthme sur la vie



Question : En raison de la crise du Coronavirus, vos rendez-vous médicaux habituels ont-ils été annulés ?

Base : Aux asthmatiques actuels




Oui, et cela a entraîné une détérioration de vos problèmes d'asthme

8%




Zoom sur les réponses des asthmatiques « sévères »



18% des asthmatiques « sévères » déclarent avoir eu un rendez-vous annulé ayant entraîné une détérioration de leurs problèmes d'asthme


Non
55%



45% des asthmatiques ont vu leur rendez-vous médicaux annulés

Oui, et cela n'a pas entraîné une détérioration de vos problèmes d'asthme
37%

*Comparatif national auprès de l'ensemble des Français**



51% des Français ayant un problème de santé ont renoncé à une consultation médicale prévue dans le cadre de leur prise en charge



Zoom sur le profil des Français ayant vu leur rendez-vous médicaux annulés



Note de lecture : 53% des asthmatiques sous traitement quotidien sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des Français se situe à **45%**




Sexe




Age




Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle



Niveau de vie



Taille de l'agglomération




Indice de masse corporelle





Diagnostiqué comme asthmatique sévère




Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)



Recours aux services de santé pour l'asthme (1 an)



Impact de l'asthme sur la vie



Question : Depuis la mise en place du confinement, avez-vous le sentiment que ces éléments se sont plutôt... ?

Base : Aux asthmatiques actuels

L'INFORMATION PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LA MANIÈRE DE CONTRÔLER/SOIGNER VOS PROBLÈMES D'ASTHME



AMÉLIORÉS



NI AMÉLIORÉS, NI DÉGRADÉS



DÉGRADÉS



LA QUALITÉ DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DU SUIVI DE VOS PROBLÈMES D'ASTHME PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



AMÉLIORÉS






NI AMÉLIORÉS, NI DÉGRADÉS



DÉGRADÉS



Asthmatiques «sévères»
Autres asthmatiques





Zoom sur le profil des asthmatiques pour qui « l'information sur la manière de contrôler/soigner vos problèmes d'asthme » s'est dégradée



Note de lecture : 25% des asthmatiques ayant eu un RDV annulé partagent cette opinion

Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des asthmatiques se situe à **11%**




Sexe




Age




Niveau de diplôme




Catégorie socioprofessionnelle



Niveau de vie




Taille de l'agglomération




Indice de masse corporelle




Diagnostiqué comme asthmatique sévère





Type de signes cliniques




Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)



Recours aux services de santé pour l'asthme (1 an)



L'impact du virus sur son suivi médical



Impact de l'asthme sur la vie

